

Onderzoeksgegevens paprika

Steenwol




Gewas en substraat: paprika, cv. Yellow Glory, steenwol

Effect van toepassing van TRIANUM: 5% hogere opbrengst

Land, jaar: België, 2008

Organisatie: Proefcentrum Hoogstraten



Productie (kg/m²) in paprika (cv Yellow Glory) bij maandelijkse toepassing vanaf opkweek (steenwol, België, 2008)

	14 mei	18 juni	5 sept	30 sept	21 okt
Onbehandeld	4,300	9,244	18,540	21,841	23,301
Trianum	4,383	9,542	19,322	23,137	24,433
effect Trianum	+2%	+3%	+4%	+6%	+5%

Trianum

www.trianum.nl

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

www.koppert.nl

Onderzoeksgegevens




Gewas en substraat: paprika, steenwol

Ziekte: Fusarium inwendig vruchtrot (kunstmatige infectie)

Effect van toepassing van TRIANUM: 68% lagere infectiedruk in het steenwolblok

Land, jaar: Nederland, 2007

Organisatie: Groen Agro Control



Trianum

www.trianum.nl

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

www.koppert.nl

Onderzoeksgegevens




Gewas en substraat: paprika, steenwol

Ziekte: Fusarium inwendig vruchtrot

Effect van toepassing van TRIANUM: bijna geen inwendig vruchtrot in commerciële paprikateelten

Land, jaar: Nederland, 2007

Organisatie: Groen Agro Control



Triatum

www.trianum.nl

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

www.koppert.nl